1958 წ.

ჭაბურღილი № 169

ადგილმდებარეობა: კაშხლის შუა კვეთის სათაო კვანძი, მდ. რიონის მარცხენა ნაპირი
ჭაბურღილის პირის აბს. ნიშ.: 268.21 მ.
ბურღვის მეთოდი: სვეტური
მ 1:200

დაწყება: 15.06.57 წ.
დამთავრება: 02.07.57 წ.



0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
წყლის გამოჩენა და დონის დამყარება სიღრმე და აბს. ნიშნული
234.91
2.VII.57წ.
კერნის გამოსავალი %
90
66
76
82
91
100
90
87
95
81
93
65
80
100
95
100
96
90
96
90
100
90
83
96
80
67
72
55
გრაფიკები
წყლის დონის ცვალებადობა
ჭაბურღილის გაყვანა
მილების გარსაცმი
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
1
2

გეოლოგიური ინდექსი	სინჯის აღების სიღრმე	შრის №	შრის სიმძლავრე	შრის ძირი		ქანის აღწერა
				აბს. ნიშ.	სიღრმე	
J_2Bi_1		1	12.30	255.91	12.30	1. ტუფობრექჩია წვრილ ნატეხოვანი, მკვრივი, მაგარი, სუსტად გამფიტული, ნაპრალოვანი.
		2	9.70	245.21	2.20	2. ტუფობრექჩია მომწვანო-ნაცრისფერი წვრილ ნატეხოვანი, მკვრივი, მაგარი, ნაპრალოვანი.
		3	11.80	234.21	33.80	3. ტუფობრექჩია წვრილ ნატეხოვანი, ნაცრისფერი მომწვანოდ შეფერილი, მაგარი, მკვრივი, მცირედ ნაპრალოვანი.
		4	9.20	225.21	43.00	4. ტუფობრექჩია საშუალოდ ნატეხოვანი, ნაპრალოვანი, მაგარი, მკვრივი, ნაცრისფერი მომწვანოდ შეფერილი.
		5	18.00	207.21	61.00	5. ტუფობრექჩია ნაცრისფერი მომწვანოდ შეფერილი, წვრილ ნატეხოვანი, მაგარი, მკვრივი, სუსტად ნაპრალოვანი.
		6	32.70	174.51	93.70	6. ტუფობრექჩია საშუალოდ ნატეხოვანი, მაგარი, მკვრივი, სუსტად ნაპრალოვანი.
		7	8.80	165.71	102.50	7. ტუფობრექჩია საშუალოდ ნატეხოვანი, ნაპრალოვანი, მაგარი, მკვრივი, ბზარები 4მმ-მდე.